ProtecTix® 100 mg/500 mg solution pour spot-on pour chiens pesant de 4 à 10 Kg - 3 x 1 ml -

Code Article : 1000296
Gencod : 8711231203925
Contient : 3 pipettes de 1 ml

- ✓ **Tue & repousse les tiques** pendant 3 à 4 semaines
- ✓ **Tue les puces** pendant 4 semaines
- ✓ **Elimine les poux broyeurs**
- ✓ **Repousse les moustiques, les phlébotomes & les mouches d'étable** pendant 2 à 4 semaines
- ✓ **Réduit le risque de transmission** de la leishmaniose canine et de l'ehrlichiose canine

ProtecTix® 100 mg/500 mg solution pour spot-on pour chiens de 4 kg à 10 kg.
Espèces cibles : Chiens. **Indications** : Traitement et prévention des infestations par les puces pendant 4 semaines ; peut être utilisé dans le cadre de la stratégie de traitement de la dermatite allergique aux piqûres de puces (DAPP).
- Élimine les poux broyeurs.
- Repousse et tue les tiques pendant 3 à 4 semaines selon les espèces de tiques.
- Les tiques déjà présentes sur le chien peuvent ne pas être tuées dans les deux jours suivant le traitement et peuvent rester attachées et visibles. Par conséquent, il est recommandé de retirer les tiques déjà présentes sur le chien au moment du traitement, afin d'éviter leur attachement et la prise de repas sanguin.
- Repousse les phlébotomes, les moustiques et les mouches des étables pendant 2 à 4 semaines.
- Réduit le risque de transmission de la leishmaniose canine (jusqu'à 3 semaines) et de l'ehrlichiose canine (jusqu'à 4 semaines).

Contre-indications : Ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 7 semaines ou de moins de 1,5 kg. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. **Ne pas utiliser sur les chats. La perméthrine est dangereuse pour les chats.**
Effets indésirables : Peu fréquent (1 à 10 animaux / 1 000 animaux traités) : Démangeaisons au site d'application, modification des poils au site d'application (par ex. fourrure grasse au site d'application) / Vomissements. Rare (1 à 10 animaux / 10 000 animaux traités) : Érythème au site d'application, inflammation au site d'application, perte de poil au site d'application / Diarrhées. Très rare (< 1 animal / 10 000 animaux traités, incluant les rapports isolés) : Sensibilité accrue de la peau (grattement, frottement)1/ Léthargie1/ Troubles du comportement (excitation, agitation, gémissement ou roulement)1,2,3/ Troubles de l'appareil digestif (hypersalivation diminution de l'appétit)1, 2, 3 / Signes neurologiques (p. ex. mouvements anormaux, secousses musculaires)1, 2, 3. *1 généralement auto-résolutifs, 2 transitoires, 3 chez les chiens sensibles à la perméthrine.* Une intoxication consécutive à une absorption orale accidentelle chez le chien est peu probable, mais peut survenir dans de très rares cas. Dans ce cas, des signes neurologiques tels que tremblements et léthargie peuvent survenir. Le traitement doit être symptomatique. Il n'existe pas d'antidote connu. Il est important de notifier les effets indésirables. **Voie d'administration** : Par application topique sur la peau. **Posologie** : 1 pipette de 1 ml. Voie externe uniquement. Garder les pipettes dans l'emballage d'origine jusqu'à leur utilisation. **Conseils pour une administration correcte** : Sortir une pipette de l'emballage. Tenir la pipette en position verticale et dévisser le bouchon. Écarter le pelage entre les omoplates jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer l'extrémité de la pipette sur la peau et presser fermement plusieurs fois pour vider le contenu directement sur la peau.

MISES EN GARDE PARTICULIÈRES : Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter tout contact du contenu de la pipette avec les yeux ou la bouche du chien à traiter. Prendre les précautions nécessaires avant d'administrer le produit vétérinaire, veillant notamment à empêcher toute ingestion du produit par léchage du site d'application par les animaux traités ou par les animaux en contact avec ces derniers. Ne pas utiliser sur les chats. Ce médicament vétérinaire est extrêmement toxique chez les chats et peut être létal. Consultez votre vétérinaire avant d'utiliser le médicament vétérinaire sur des chiens malades et affaiblis.
Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux : Les personnes présentant une sensibilité cutanée connue peuvent être particulièrement sensibles à ce médicament vétérinaire. Le médicament vétérinaire ne doit pas être administré par les femmes enceintes et les femmes susceptibles de l'être. Un équipement de protection individuelle composé de gants doit être porté lors de la manipulation du médicament vétérinaire par les femmes en âge de procréer. Les femmes enceintes et les femmes susceptibles de l'être doivent éviter tout contact direct avec l'animal traité pendant les 12 heures suivant l'application du produit. Les animaux traités ne doivent pas être manipulés pendant au moins 12 heures après l'application du produit. Il est donc recommandé de traiter l'animal le soir. Les animaux traités ne doivent pas être autorisés à dormir avec leurs propriétaires, en particulier les enfants. Afin d'éviter que les enfants aient accès aux pipettes, conservez la pipette dans son emballage d'origine jusqu'à ce qu'elle soit prête à l'emploi et jetez immédiatement les pipettes usagées. Éviter tout contact entre le médicament vétérinaire et la peau, les yeux ou la bouche. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application. Se laver soigneusement les mains après usage. En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact accidentel du médicament vétérinaire avec les yeux, rincez-les soigneusement à l'eau. Si l'irritation de la peau ou des yeux persiste consulter immédiatement un médecin et lui montrer la notice ou l'étiquette. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion accidentelle, demander immédiatement conseil à un médecin et lui montrer la notice ou l'étiquetage. Ce médicament contient du butylhydroxytoluène (E321) et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact) ou une irritation des yeux et des muqueuses.
Autres précautions : Le médicament vétérinaire étant dangereux pour les organismes aquatiques, les chiens traités ne doivent en aucun cas avoir accès aux cours d'eau pendant 48 heures après le traitement. Le solvant contenu dans le médicament vétérinaire peut tacher certains matériaux, notamment le cuir, les tissus, les plastiques et les surfaces texturées. Laisser sécher le site d'application avant de permettre le contact avec de tels matériaux.
Gestation et lactation : L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie en cas de gestation, la lactation, ou chez les animaux destinés à la reproduction. L'utilisation ne doit se faire qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque établie par le vétérinaire responsable.
Surdosage : Aucun signe clinique indésirable n'a été observé chez les chiots sains ou les chiens adultes exposés à un surdosage de 5 fois la dose ou chez les chiots dont les mères ont été traitées avec un surdosage 3 fois la dose du médicament vétérinaire.
Incompatibilités majeures : En l'absence d'étude de compatibilité, ce médicament vétérinaire ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments vétérinaires.

Liste de la substance active et autres ingrédients : 1 pipette de 1 ml contient : Substance active : : Imidaclopride 100 mg, Perméthrine 500 mg.
Excipients : Butylhydroxytoluène 0,4 mg, N-méthylpyrrolidone 187 mg. Solution transparente jaune clair.
AMM n° FR/V/8691898 9/2023. **Titulaire** : Beaphar B.V., Drostenkamp 3, 8101 BX Raalte, Pays-Bas.

Beaphar s.a.s. *2 Allée Vivaldi – Le San Giorgio – 06800 Cagnes sur mer*
Tél. : 04.93.19.05.20 e-mail : info@fr.beaphar.com